OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

42,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

TRENTE-SIXIÈME FASCICULE

(1er septembre 1922)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS
" LES IMPRIMERIES RÉUNIES
15, RUE D'ENGHIEN, 15

1922

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

Nouveautés diverses[1]

Scaphidium atripenne n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufus, antennis apice elytrisque nigris, thorace parum breve, antice attenuato, in disco sparse punctato; elytris brevibus, in disco lineato-punctatis et pro parte disperse punctatis. Long. 4 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa coloration, pouvant prendre place près de *unifasciatum* Pic.

Scaphidium rufipes n. sp. Parum elongatus, minute et sparse punctatus, rufus, antennis apice nigris. Long. 6 mill. Tonkin. — Voisin de *Vitalisi* Ach., et distinct, à première vue, par sa coloration rousse.

Scaphosoma tonkineum n. sp. Subovatus, nitidus, niger, capite antice, membris et abdomine apice rufis, elytris apice testaceo marginatis, his postice punctatis, stria suturalis reducta. Long. 2 mill. Tonkin. — A placer près de *Bedeli* Ach.

S. 4-maculatum n. sp. Subovatus, nitidus, minute punctatus, niger, membris testaceis, elytris in disco antice et postice rufo maculatis, apice rufo-testaceo marginatis, stria suturalis reducta. Long. 1,5 mill. Tonkin. — Voisin du précédent.

S. Phungi n. sp. Oblongus, nitidus, fortiter sat sparse punctatus, rufo-testaceus, thorace in disco elytrisque nigris, his antice rufo maculatis et apice sat late luteis, stria suturalis ad basin parum prolongata.

(1) Se reporter à la note du 35e fascicule pour explications semblables.

Long. 2 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *sinense* Pic.

Pseudoscaphosoma binhanum n. sp. Subovatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris ad basin et ante apicem nigro fasciatis; thorace læve; elytris fortiter et sparse punctatis, stria suturalis reducta. Long. 2 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *niasense* Pic.

Bæoceridium sericeum n. sp. Oblongus, apice truncatus, nitidus, sericeo-pubescens et minute punctatus, rufus, thorace in disco elytrisque piceis, his apice rufescentibus, stria suturalis reducta. Long. 2 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa coloration et son revêtement grisâtre soyeux. Par ses cuisses peu épaisses, ses tibias intermédiaires presque droits, peut rentrer dans un nouveau sous-genre que j'appelle **Bæoceridiolum.**

Chelonarium rufum n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, rufus, tarsis testaceis, sparse pro parte indistincte punctatus; elytris sparse luteo pilosis, postice fascia arcuata interrupta albida notatis. Long. 5,5 mill. Costa-Rica. — Voisin de *subpubescens* Chevr. coloration plus claire, élytres autrement et moins pubescents.

C. grande n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, tarsis rufis, sparse et parum pubescens, pro parte fortiter punctatus; thorace parum breve, lateraliter subsinuato, in disco impresso; elytris parum elongatis, postice attenuatis, ad basin biimpressis, irregulariter et mediocre punctatis. Long. 10 mill. Costa-Rica. — Espèce remarquable par sa grande taille et son aspect presque glabre, pouvant se placer près de *gyrinoïdes* Chevr.

C. tonkineum n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, sparse pubescens, rufus, elytris late piceis, thorace posti e elytrisque albo maculatis; thorace subsinuato, antice arcuato, reflexo, punctato-ruguloso; elytris pa-

rum elongatis, postice attenuatis, irregulariter punctatis. Long. 5-5,5 mill. Tonkin. — A placer près de *adspersum* Chevr.

Syncalypta suturalis n. sp. Subovatus, rufus, fusco setulosus, sutura thoraceque aliquot in disco piceis; elytris substriatis, fortiter lineato punctatis. Long. 1,5 mill. Hanoï. — A placer près de *pilosella* Mots. — Très voisin du précédent est la **S. striata** mihi, du Brésil, qui se distingue, à première vue, par les élytres nettement striés et sans rangées de gros points.

Limnichus Latr. Dans ce genre peuvent rentrer les diverses nouveautés suivantes, ayant d'ordinaire de 1 à 2 mill. de long., voisines de *tonkineus* Frm. : **densatus,** de Java, élytres à ponctuation dense, mais plus forte que chez *tonkineus* ; — **curtus,** de Java, distinct par sa forme courte et trapue ; — **subelongatus,** de Sumbawa, à élytres assez finement ponctués avec une forme un peu allongée ; — **diversus,** des Iles Philippines, de forme subovalaire et médiocrement ponctué, est orné de quelques soies claviformes ; — **fulvopubens,** de Chine, de forme allongée, finement et densément ponctué, revêtu d'une pubescence fauve ; — **sulcatulus,** de la Guadeloupe, peu allongé, revêtu d'une pubescence mouchetée jaune ou grise et caractérisé par le prothorax un peu sillonné au milieu.

Limnichus Astruci n. sp. Subovatus, nitidus, sat regulariter luteo-sericeo pubescens, niger, membris rufis ; thorace minute punctato ; elytris antice fortiter et irregulariter punctatis. Long. 2 mill. Indes. — A placer près de *sericeus* Duft.

L. trachyformis n. sp. Subovatus, postice distincte attenuatus, griseo pubescens, niger, membris rufis ; elytris ad suturam substriatis, pro parte lineato-punctatis. Long. 2 mill. Indes. — Espèce des plus distinctes par sa forme, jointe à sa structure élytrale.

L. javanicus n. sp. Subovatus, griseo-fulvo pubes-

cens, mediocre punctatus, niger, membris testaceis. Long. 1,5 mill. Java. — A placer près de *incanus* Ksw.

Limnicomorphus n. gen. J'établis ce genre pour une petite espèce courte et trapue, ayant la tête très rentrée dans le prothorax, celui-ci un peu échancré en avant, l'écusson peu distinct. — A placer près de *Limnichus* Latr.

Limnicomorphus curtulus n. sp. Subovatus, pro parte griseo-sericeo pubescens, minute punctatus, niger, membris rufis. Long. 1 mill. Tonkin.

Limnichoderus Casey. Plusieurs espèces nouvelles, du Brésil, peuvent se classer dans ce genre: **minutus** petit, ovalaire, uniformément pubescent de jaune, noir, un peu bronzé, avec les membres roux, élytres longs, densément et irrégulièrement ponctués; — **vicinus,** voisin du précédent, mais avec le prothorax sillonné au milieu et les élytres plus fortement ponctués; — **oblongus,** oblong avec la pubescence en partie mouchetée de jaune ou de gris et les élytres assez fortement ponctués; — **elongatus,** allongé, en partie pubescent de jaune et distinct par les angles antérieurs du prothorax très saillants.

Le **Limnichoderus convexus** mihi, de la R. Argentine, est ovalaire, convexe, densément ponctué, noir, à reflets bronzés et orné d'une pubescence jaune, ou grise, disposée en mouchetures. Long. 1,5 mill.

Macrobyrrhinus n. gen. Antennis gracilibus, apice paulo dilatatis; capite paulo exserto, antice non sulcato, elytris ad basin non excavatis. — Genre voisin de *Byrrhodes* Mots.

Macrobyrrhinus Rouyeri. Oblongus, holosericeo pubescens, nigro-subæneus, tarsis testaceis; capite thoraceque dense punctatis, elytris pro parte fortiter et irregulariter punctatis. Long. 5 mill. Sumatra.

Simplocarina n. gen. Antennis brevibus, apice paulo

dilatatis; capite paulo exserto; thorace breve, antice lateraliter fortiter impresso. — Genre voisin du précédent, caractérisé par ses antennes courtes et la structure de son prothorax. La forme du corps rappelle un peu certains *Dermestides*.

S. curticollis n. sp. Subovatus, postice attenuatus, breve luteo aut griseo irregulariter pubescens, dense punctatus, nigro subænescens, antennis ad basin rufis. Long. 3 mill. Côte d'Ivoire.

Byrrhinus apicalis n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, griseo hirsutus, piceus, elytris apice rufis, his fortiter et irregulariter punctatis, membris testaceis. Long. 2,5 mill. Afrique : Katanga. — Espèce très distincte par sa coloration, jointe à sa ponctuation élytrale.

Byrrhinus testaceipes n. sp. Subovatus, parum convexus, nitidus, griseo hirsutus, minute punctatus, piceus, elytris apice rufis, membris testaceis. Long. 3 mill. Sumatra. — Peut se placer près de *latro* Mts. — Le **B. irregularis** mihi, de Célèbes, est un peu plus allongé et plus petit, noir en dessus, moins pubescent et les élytres présentent quelques gros points. — Le **B. niger** mihi, du Tonkin, est peu convexe, noir avec les membres plus ou moins roussâtres, les élytres ont antérieurement une ponctuation forte et irrégulière. — Le **B. punctatus** mihi, des Iles Philippines, a, comme le précédent, une forte ponctuation élytrale, mais le prothorax est fortement ponctué et la coloration du corps est un peu rembrunie, au moins sur les élytres. — Le **B. hirsutus** mihi, de la Guyane, est un peu allongé, bien pubescent, la pubescence étant en partie dressée, les élytres ont des rangées de gros points et le dessus du corps est noir à vagues reflets métalliques. — Le **B. gracilicornis** mihi, du Brésil, a les derniers articles des antennes plus allongés et moins gros, il est noir en dessus et a les élytres fortement, mais en partie régulièrement ponctués. Cette dernière espèce, par la forme de ses antennes et par ses élytres presque de la largeur

du prothorax à la base, et peu entaillés en avant, peut rentrer dans un nouveau sous-genre que je nomme **Byrrhininus.**

Anthrenus albonotatus n. sp. Rotundatus, niger, squamosus, squamis inferis albis, superis nigris, thorace lateraliter late albo, in disco albo maculato, elytris albo-maculatis. Long. 2 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *globiger* Ar.

Trinodes tonkineus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus; luteo ad albo hirsutus, niger, membris pro parte rufis; thorace breve, sparse punctato, distincte marginato. Long. 2 mill. Tonkin. — Plus foncé et moins large que *Guernei* Pic.

T. minor n. sp. Subovatus, nitidus, longe hispidus, niger, membris rufis, femoribus pro parte piceis; elytris distincte et irregulariter punctatis. Long. 1 mill. Tonkin. — Voisin de *minutus* Pic, moins rétréci en arrière, etc.

Orphinus tonkineus n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, parum pubescens, mediocre punctatus, niger, membris rufis, thorace elytrisque apice rufescentibus. Long. 2,5 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *minor* Ar., ponctuation différente, élytres roux au sommet, etc.

Mesocœlopus Castelsi n. sp. Subovatus, convexus, nitidus, luteo pubescens, rufus, membris testaceis. Long. 2 mill. Indes. — Moins robuste que *indicus* Pic et autrement coloré.

Castrallus obscuripennis n. sp. Elongatus, subopacus, rufus, elytris nigris, apice rufescentibus, his fere instriatis, satis elongatis; thorace breve, medio sat regulariter convexo, antice breve carinato. Long. 2 mill. Indes Mér. — Diffère de *cuculatus* Lesne par le prothorax moins large que les élytres, les yeux plus grands, etc.

Le **C. testaceicornis** mihi, de Formose, est moins allongé, le prothorax est plus droit sur les côtés (vu de dessus), les élytres sont régulièrement arrondis et non un peu subtronqués, au sommet, enfin ceux-ci sont un peu foncés seulement au milieu et marqués de roux à la base et au sommet.

Petalanobium n. gen. Capite supra distincta; thorace breve, lateraliter valde marginato, deplanato, infoveolato, elytris latiore. — Genre voisin de *Petalium* Lec. et distinct, à première vue, par la structure du prothorax et la tête non encapuchonnée.

Petalanobium auratum n. sp. Parum elongatus, subparallelus, rufescens, luteo-aurato pubescens, in elytris lineolatus, elytris fortiter lineato-punctatis, apice subrotundatis. Long. 2,5 mill. Ile Bourbon.

Ptinus rufimembris n. sp. Oblongus, hirsutus, niger, membris rufis, thorace paulum elongato, postice sulcato et albo-notato; elytris brevibus, subparallelis, minute striatis, antice et postice albo fasciatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin de *Langei* Pic, mais élytres avec 2 fascies blanches étroites, la première arquée en avant, la seconde presque droite et prolongée sur la suture postérieurement.

Ptinus curtithorax n. sp. Oblongo-ovatus, niger, pro parte aureo aut albo pubescens, pedibus rufis; capite granulato, postice læve; thorace breve, transverso, aureo fasciculato; elytris brevibus, nigris, apice rufis, antice et postice diverse luteo notatis et pro parte fasciatis. Long. 3 mill. Australie. — Espèce très distincte par sa forme, jointe à son revêtement. Peut se placer près de *microscopicus* Lea.

Xylographus dentatus n. sp. Oblongus, nitidus, sparse et breve pubescens, fortiter pro parte dense punctatus, piceus, antennis pedibusque rufis; thorace in mare antice et capite breve sat late bidentatis. Long. 2,5-3 mill. Congo. Bien caractérisé par la structure de son avant-corps.

X. longicollis n. sp. ♀ Oblongo-elongatus, nitidus, glaber, sat fortiter et sparse punctatus, niger, membris rufis; thorace elongato, antice attenuato et breve truncato; elytris brevibus. Long. 5 mill.? Dahomey. — Voisin de *nitidissimus* Pic, forme moins élargie, prothorax plus large, etc.

Falsocis opacus v. nov. flavus. Coloration flave. Guyane.

Ennearthron longepilosum n. sp. Oblongus, nitidus, longe pilosus, rufo-testaceus. Long. 3 mill. Indes Mér. — Espèce très distincte par ses longs poils dressés.

E. brevehirsutum n. sp. Oblongus, nitidus, breve hirsutus, fortiter pro parte dense punctatus, piceus, elytris aliquot apice rufescentibus, membris testaceis; capite antice in mare breve bidentato et thorace antice laminato, lamina parum incisa. Long. 2,5 mill. Cameroun.

Nanophyes bicoloripes n. sp. Subovatus, nitidus, parum dense et regulariter griseo pubescens, niger, sutura rufescens, scapo apice femoribusque ad basin flavis; rostro parum breve, carinato, arcuato; elytris striatis, apice subrotundatis; clava antennarum triarticulata; femoribus distincte dentatis. Long. 2 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *nigritulus* Boh. dont les cuisses sont mutiques.

N. Phungi n. sp. Minutus, subovatus, nitidus, griseo pubescens, rufus aut testaceus, clava antennarum (triarticulata), capite aut rostro ad basin plus minusve pectoreque nigris ; thorace bi et elytris ad basin tri piceo-maculatis. Long. 1,5 mill. Tonkin. — Ressemble à *suturalis* Pic avec une coloration différente.

Saula atricornis n. sp. Niger, infra corpore pro parte, thorace lateraliter, scutello, elytris tarsisque rufis aut testaceis; thorace transverso, lateraliter fere recto; elytris satis brevibus. Long. 3 mill. Tonkin.

— Voisin de *fuscicornis* Frm., prothorax différent, pattes toutes noires, etc.

S. testaceipes n. sp. Testaceus, antennis 2 et sequentibus nigris; thorace breve, postice lateraliter subsinuato; elytris paulo elongatis, apice attenuatis. Long. 4 mill. Tonkin. — La var. *diversicornis* a le 3e article des antennes testacé. — Espèce voisine de *fuscicornis* Frm. très distincte par sa coloration presque entièrement testacée.

S. fuscicornis v. nov. diversipes. Capite, thorace et articulis basalibus antennarum infra rufis, pedibus testaceis, femoribus apice piceis. Tonkin.

Stenotarsus Baeri n. sp. Subovatus, luteo pubescens, convexus, rufus, antennis ad basin et apice rufis, his validis; thorace breve, lateraliter subarcuato, sparse punctato; elytris irregulariter et parum sparse punctatis. Long. 6 mill. Pérou. — A placer près de *coccineus* Perty.

Stenotarsoides notaticollis n. sp. Oblongo-ovatus, luteo pubescens, rufus, antennis apice nigris, thorace in medio elytrisque in disco nigro piceo notatis, his pro parte lineato-punctatis, sed fere instriatis. Long. 4 mill. Iles Philippines. — Peut se placer près de *plagiatus* Gorh.

S. Alfierii n. sp. Subovatus, luteo pubescens, testaceus, clava antennarum piceo, elytris in disco longe piceo notatis, his pro parte regulariter punctatis. Long. 3 mill. Indes. — Moins robuste que le précédent avec le prothorax concolore, les élytres plus longuement marqués de noir et différent, d'autre part, de *medianus* Gorh. par la forme non subparallèle.

Endomychus tonkineus n. sp. Oblongo-ovatus, niger, elytris et infra corpore rufis. Long. 4 mill. Tonkin. — Voisin de *bicolor* Gorh. avec tout le dessous du corps (sauf prothorax) roux.

E. atrimembris n. sp. Oblongo-ovatus, rufus, antennis pedibusque nigris, tarsis testaceis. Long. 4 mill. Indes. — Voisin du précédent.

Cænomychus humeralis n. sp. Oblongus, piceus, antennis ad basin, et pedibus pro parte rufis, elytris nigro-metallicis, ad humeros et post scutellum rufo-testaceo notatis. Long. 5,5 mill. Kashmir. — Espèce très distincte par sa coloration.

Mycetina gabonica n. sp. Oblongo-subovatus, rufus, antennis nigris, articulis primis et ultimo apice rufis exceptis; antennis apice dilatatis; thorace breve, valde transverso, explanato, angulis anticis rotundatis; elytris thorace paulo latioribus, brevibus, postice parum attenuatis, lateribus pro parte deplanatis, humeris prominulis. Long. 4 mill. Gabon. — Paraît devoir se placer près de *africana* Gorh.

Leptoscapha bifasciata n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris ad basin et postice piceo fasciatis; thorace parum elongato, lateraliter fere recto; elytris thorace paulo latioribus, satis elongatis, postice attenuatis, irregulariter punctatis. Long. 4,5 mill. Java. — Voisin de *lignicola* Gravely et distinct, à première vue, par la forme plus allongée.

Le **L. reducta** mihi, de Sumbawa, un peu plus petit, a les antennes robustes, le dessus nettement pubescent, les élytres brièvement marqués de brun noir après le milieu et plus longuement vers la base.

L. forticornis n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris ad humeros et postice nigro notatis; thorace transverso; elytris satis brevibus, postice valde attenuatis. Long. 5 mill. Bornéo. Voisin des précédents, mais prothorax très transversal et élytres moins allongés.

Anacycus vicinus n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-viridescens, thorace pro parte violaceo, parum sparse punctato ; elytris substriatis, sat fortiter punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 7 mill. Chine. —

Un peu plus étroit que *Pellegrini* Pic, avec la coloration et la ponctuation du prothorax différentes.

A. malabarensis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, supra metallicus, pro parte viridescens, pro parte violaceo-purpureo tinctus; thorace breve, parum sparse punctato; elytris substriatis, sat fortiter punctatis, intervallis latis, multi punctatis. Long. 9 mill. Indes. — Voisin du précédent, et aussi de *alternatus* Frm.

A. rufipennis n. sp. Valde elongatus, nitidus, rufescens, pro parte iridescens, capite thoraceque subæneis; thorace satis breve, minute et sparse punctato ; elytris minutissime et parum distincte striatis, minute punctatis. Long. 7 mill. Indes. — Espèce très distincte des précédentes par sa fine ponctuation élytrale disposée sur des stries à peine distinctes.

A. ænescens n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra ænescens, membris pro parte rufescentibus; thorace breve, minute punctato; elytris minutissime striatis et minute punctatis. Long. 7 mill. Bornéo. — Très voisin du précédent par sa ponctuation, mais coloration différente et forme moins élancée.

A. punctatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, pro parte piceus, supra olivaceo-ænescens; thorace breve, minute et sparse punctato; elytris sat fortiter lineato-punctatis. Long. 8 mill. Chine. — Très facile à distinguer du précédent par les élytres à rangées d'assez gros points.

Amarygmus sinensis n. sp. Oblongo-ovatus, nigro-cærulescens, elytris pro parte cupreis, his minute striato-punctatis; thorace breve, minute et sparse punctato. Long. 8 mill. Chine. — Peut se placer près de *ænescens* Frm.

A. bicoloriceps n. sp. Oblongo-ovatus, nigro-piceus, supra metallicus, capite inter oculos violaceo; thorace breve, minute et sparse punctato, purpureo, cupreo et violaceo tincto; elytris fere instriatis, sat fortiter

lineato-punctatis, in disco æneis, lateraliter viridi et purpureo cinctis. Long. 8 mill. Sumatra. — Très distinct du précédent par la coloration et la plus forte ponctuation élytrale.

A Adonis n. sp. Oblongo-elongatus, niger, supra metallicus, viridis, pro parte et diverse purpureo tinctus; thorace breve, sat dense punctato; elytris fere instriatis, minute lineato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 6-7 mill. Tonkin. — Jolie espèce, pouvant prendre place près de *multicolor* Frm.

Voisin de cette espèce est le **malaccanus** mihi, de Malacca, qui est en partie olivâtre-bronzé sur les élytres avec le prothorax très finement et éparsément ponctué.

Cephaloplonyx n. gen. Corpus oblongo-ovatus; capite parum prominulo, antice transverse et inter oculos fortiter sulcato, oculis valde distantibus; femoribus anticis dentatis; prosterno postice longe prolongato; mesosterno excavato. — Ce genre, voisin de *Hoplonyx* Ths., et à faciès de *Amarygmus* Dalm., présente une tête particulière, trisillonnée entre les yeux et munie d'un autre sillon transversal en avant de ces organes.

Cephaloplonyx opacus n. sp. Oblongo-ovatus, opacus, glaber, piceus, antennis tarsisque rufis; capite parum punctato; thorace breve, lateraliter subarcuato, mediocre punctato; elytris thorace paulo latioribus, striato-punctatis, punctis postice minutis, intervallis convexis. Long. 9-10 mill. Ceylan.

Eupezoplonyx n. gen. Corpus robustus; capite satis prominulo, oculis distantibus, valde emarginatis; femoribus anticis dentatis; prosterno postice prominulo et tuberculato, mesosterno excavato. — Faciès de *Hoplonyx* Ths., mais cuisses antérieures très prolongées en avant du corps; tête à faibles oreillettes et yeux plus écartés.

Eupezoplonyx ater n. sp. Robustus, nitidus, niger,

antennis tarsisque rufis; capite fortiter et sparse punctato; thorace breve, lateraliter subarcuato, sat sparse et late punctato; elytris thorace paulo latioribus, striato-punctatis, punctis postice minutis, intervallis convexis. Long. 15 mill. Ceylan.

Hoplonyx luteopubescens n. sp. Parum elongatus, nitidus, thorace luteo piloso, nigro-piceus, supra subæneus, oculis valde distantibus; thorace dense punctato; elytris antice striato-foveolatis, postice undulato striatis, intervallis convexis, fere impunctatis. Long. 14 mill. Côte d'Ivoire. — Paraît voisin de *latifrons* Geb.; très distinct par le prothorax orné d'une courte pubescence jaune.

H. sulcatipes n. sp. Elongatus, opacus, glaber, brunneus, capite thoraceque piceis, illo dense punctato; elytris minute striato-punctatis, tibiis diverse arcuatis, sulcatis. Long. 11 mill. Sénégal. — Peut se placer près de *parvicollis* Geb.

H. Favareli n. sp. Oblongus, fere opacus, glaber, niger, oculis distantibus; thorace dense punctato; elytris striatis, striis minute punctatis, intervallis convexis, parum punctatis. Long. 13 mill. Fort Sibut. — Voisin du précédent, plus foncé et plus robuste.

H. insulcatipes n. sp. Elongatus, subopacus, glaber, niger; oculis approximatis; thorace minute et sparse punctato; elytris striato-crenulatis aut punctatis, intervallis convexis, fere impunctatis. Long. 14-15 mill. Fort Crampel. — Voisin du précédent, un peu plus allongé avec les tibias non sillonnés.

Toxicum arcuaticorne n. sp. ♂ Angustatus, parallelus, opacus, breve pilosus, niger; capite excavato; thorace subquadrato, dense punctato, cornis valde arcuatis, parum villosis; elytris substriato-punctatis. Long. 9 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa forme et ses cornes nettement arquées l'une vers l'autre.

Lagria Auberti n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus,

niger, elytris rufescentibus, antennis ad basin, tibiis tarsisqce testaceis; antennis elongatis; thorace breve, antice rotundato; elytris thorace valde latioribus, pro parte plagis nitidis munitis. Long. 8 mill. Madagascar. — Par sa sculpture élytrale se rapproche de *dermatodes* Frm.

L. albohirsuta n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, niger, elytris pro parte plagis nitidis munitis. Long. 8-9 mill. Madagascar. — Plus allongé que le précédent, plus foncé, avec la pubescence blanche, en partie disposée en rangées sur les élytres.

L. longeapicalis n. sp. Elongatus, nitidus, hirsutus, nigro-piceus, capite thoraceque antice rufis, his dense punctatis; antennis filiformibus, elongatis, articulo ultimo longissimo; thorace parum breve, sulcato; elytris thorace valde latioribus, elongatis, antice impressis, apice valde attenuatis. Long. 8 mill. Madagascar. — Espèce très distincte par sa coloration jointe à sa structure antennaire; peut se placer près de *decolora* Borch.

La **L. Sikorai** mihi, voisine, est plus large, courtement pubescente, le prothorax n'est pas sillonné, mais impressionné postérieurement et la coloration du dessus du corps est à peu près uniforme, d'un roux brunâtre.

L. Pouilloni n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, breve pubescens, dense punctatus; brunnescens, capite, thorace, antennis ad basin scutelloque rufis, antennis apice nigris, his elongatis, apice paulo dilatatis, articulo ultimo parum elongato; thorace satis breve, antice attenuato; elytris thorace valde latioribus, antice paulo impressis, postice parum dilatatis et apice attenuatis. Long. 8 mill. Madagascar. — Plus allongé que le précédent et de coloration différente.

L. tananarivana n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, dense punctatus, hirsutus, niger, antennis ad basin pedibusque pro majore parte testaceis; thorace breve,

antice et postice testaceo limbato; elytris rufis, antice ad suturam nigro notatis et impressis. Long. 5 mill. Madagascar. — Peut se placer près de *fuliginosa* Frm.

L. curticornis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, dense punctatus, breve pubescens, nigro-piceus, capite antice, antennis ad basin, pedibus pro majore parte, thorace antice et postice elytrisque testaceis; antennis robustis, apice dilatatis; thorace breve, parum transverso; elytris subparallelis, apice paulo attenuatis, antice gibbosis. Long. 5 mill. Madagascar. — Plus allongé que le précédent avec le prothorax moins large et la pubescence plus courte.

Le **robusticornis** mihi, de la même origine, très voisin du précédent, a la tête foncée avec les yeux plus rapprochés chez ♂, le prothorax plus foncé, les élytres non gibbeux derrière l'écusson. La ♀ de cette espèce est plus robuste et a les antennes plus courtes.

L. atricornis n. sp. Parum elongatus, nitidus, dense punctatus, breve pubescens, niger, elytris rufescentibus; antennis elongatis, subfiliformibus; thorace satis lato, postice rufo marginato; elytris antice valde impressis et distincte gibbosis. Long. 6 mill. Madagascar. — Par sa coloration voisin de *nigriceps* Frm.

Le **impressithorax** mihi, de Madagascar, à coloration analogue au précédent, s'en distingue par les yeux plus rapprochés, le prothorax fortement impressionné postérieurement, les élytres sans forte impression antérieure et les pattes rousses.

L. latior n. sp. Oblongo-subovatus, parum nitidus, breve pubescens, rufo-testaceus, antennis apice, tibiis tarsisque piceis; thorace breve, in disco impresso; elytris latis, oblongo-ovatis, dense punctatis. Long. 8 mill. Madagascar. — A placer près de *pallida* Cast.

L. madecassa n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, antennis, articulis primis rufis exceptis, pedibusque nigris, femoribus ad basin rufis; antennis elon-

gatis, apice paulo dilatatis; thorace breve, rugulosopunctato, in disco impresso; elytris parum latis. Long. 7 mill. Madagascar. — La var. nov. **diversemembris** a les pattes rousses et les antennes largement testacées à la base. — Voisin du précédent.

L. annulipes n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, dense punctatus, breve pubescens, testaceus, antennis et femoribus apice, tibiis ad basin late tarsisque nigris; antennis elongatis, filiformibus, articulo ultimo satis elongato; thorace breve, satis angustato, in disco impresso; elytris thorace valde latioribus, apice breve attenuatis. Long. 8 mill. Madagascar. — Peut se placer près de *adusta* Klug.

L. opacithorax n. sp. Oblongo-elongatus, dense punctatus et breve pubescens, testaceus, antennis apice oculisque nigris; pedibus pro parte brunneis; antennis elongatis, filiformibus; thorace breve, opaco, in disco late impresso; elytris nitidis, minute et dense punctatis, parum latis, apice attenuatis. Long. 11 mill. Madagascar. — A placer près de *decolora* Borch.

Heterogria semimetallica n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, niger, elytris viridi-metallicis, antennis ad basin, capite thoraceque rufis. Long. 6 mill. Médan. — Plus allongé que *atripennis* Pic, avec les élytres métalliques, la ponctuation plus forte sur l'avant-corps, etc.

H. impressiceps n. sp. Robustus, oblongus, nitidus, rufus, elytris castaneis, antennis nigris, ad basin rufis, his validis; capite antice impresso et inter oculos foveolato; thorace parum transverso, irregulariter sat dense punctato; elytris minute striatis, sat fortiter punctatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *annamita* Pic. — La **H. Tonkinea** mihi, du Tonkin, voisin, n'a pas la tête fovéolée entre les yeux, le prothorax est moins droit sur les côtés et plus large, les élytres sont roux comme l'avant-corps.

Nemostira fortithorax n. sp. Elongatus, nitidus, sparse hirsutus, rufus, antennis ad basin, capite antice, femoribus pro parte tibiisque nigris; capite thoraceque parum punctatis, illo sat elongato, robusto, postice marginato; elytris sat fortiter et multi striato-punctatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *nigriceps* Pic.

N. bicoloripes v. nov. diversa. Thorace late nigro, elytris rufis, apice nigris. Tonkin.

Othnius ocularis n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, membris testaceis, elytris ad suturam testaceo ornatis. Long. 4 mill. Tonkin. — Espèce voisine de *notaticollis* Pic, yeux plus saillants, prothorax foncé et subarqué latéralement, élytres plus courts, ayant seulement un dessin particulier testacé en forme de x.

Serropalpus binhanus n. sp. Elongatus, nitidus, fulvo-pubescens, piceus; capite elytrisque postice rufescentibus, membris rufis; prosterno elongato, elytris striatis. Long. 7-10 mill. Tonkin. — Cette espèce, très caractérisée par son prosternum longuement prolongé en pointe postérieurement, d'où hanches antérieures ne se touchant pas, peut, par ce caractère plastique, rentrer dans un sous-genre nouveau, que je nomme **Mimoserropalpus.**

S. testaceicollis n. sp. Angustatus, griseo pubescens, niger, articulo primo antennarum, abdomine apice, femoribus ad basin thoraceque testaceis, illo antice nigro maculato; elytris fere instriatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa forme étroite jointe à sa coloration.

Phungia n. gen. Oculis fortiter granulatis; articulo ultimo palparum satis valido, apice truncato; pygidio satis breve; tibiis posticis parum carinatis. — Genre voisin de *Mordella* L. et caractérisé par les caractères énumérés ci-dessus.

Phungīa rufa n. sp. Parum elongatus, rufus, luteo-purpureo pubescens, minute sat dense punctatus. Long. 7 mill. Tonkin.

Mordella lacsonensis n. sp. Parum elongatus, niger, infra corpore pro parte albo pubescente, thorace transverse albo bifasciato, elytris albo 4 maculatis. Long. 8-10 mill. Tonkin. — Dessins de *Rouyeri* Pic, mais écusson noir et forme un peu plus allongée.

Ocularium n. gen. Corpus elongatus; articulo ultimo palparum elongato, truncato; oculis approximatis, longe incisis; thorace in disco postice impresso; coxis anticis conicis, approximatis; tarsis pro parte dilatatis. Genre curieux, très caractérisé par ses yeux gros, longuement entaillés, et les antennes insérées au fond de cette échancrure. Peut prendre place près de *Sparedrus* Latr.

Ocularium rufum n. sp. Elongatus, parum nitidus, paulo pubescens, dense et ruguloso punctatus, rufus, pedibus pallidioribus, tibiis pro parte nigris. Long. 8 mill. Tonkin.

Hylophilus (1) **binhanus** n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger, articulis ultimis antennarum, geniculis tarsisque rufis; capite robusto, postice emarginato, oculis validis, parum distantibus, antennis validis; thorace subquadrato, angulis anticis rotundatis; elytris ad basin valde impressis; femoribus posticis validis, tibiis ad basin arcuatis, tibiis intermediis ad basin dilatatis. Long. 3 mill. Tonkin. — A placer près de *japonicus* Chp.

Anthicomorphus atronotatus n. sp. Oblongus, nitidus, mediocre punctatus et parum pubescens, rufus, anten-

(1) *Hylophilus albonotatus* Pic (1913) est à muter en **alboornatus** ; *albonotatus* Pic (1914) à muter en **albofasciatus**, à cause de *albonotatus* Chp. (1895) ; *H. bipartitus* Pic (1914), préoccupé par *bipartitus* Pic (1901) est à muter en **bipartitipennis** et var. *diversiceps* Pic (1920) à muter en **dispariceps**.

nis nigris, ad basin et apice rufis; thorace rufo, in disco nigro notato, parum elongato; elytris rufis, ad basin et ad medium nigro notatis, antice sat fortiter depressis. Long. 3 mill. Luzon. — Voisin de *sulcatipennis* Pic, plus allongé et élytres maculés de foncé.

Formicomus maximus n. sp. ♂ Elongatus, elytris satis latis, nigro-æneseens, supra viridescens; capite strigoso, collo longo munito; thorace satis elongato, parum robusto; elytris ad basin nitidioribus et sparse punctatis, antice griseo fasciatis, postice late griseo notatis; femoribus anticis breve dentatis, tibiis subsinuatis. Long. 8 mill. Luzon. — Voisin de *bifasciatus* Pic, élytres en partie subopaques et pubescents vers l'extrêmité, cuisses antérieures munies d'une dent courte et robuste.

F. binhensis n. sp. ♂ Oblongus, sparse pilosus et punctatus, nitidus, nigro-metallicus, femoribus ad basin rufis; femoribus anticis longe dentatis, tibiis breve dentatis. Long. 4,5 mill. Tonkin. — Voisin de *animatus* Pic, dent des cuisses moins large, simplement émoussée au sommet et pattes non entièrement foncées.

F. signatus n. sp. Elongatus, nitidus, breve pubescens, testaceus, supra brunneus, elytris nigris, ad basin rufis, oblique rufo griseo bifasciatis, fasciis ad suturam junctis, humeris nullis. Long. 3 mill. Cochinchine. — Par sa forme voisin de *aulicus* Laf. et rappelant, d'autre part, *Stenidius villatus* Luc.

Pseudoleptaleus cephalotes n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, thorace postice, elytris, his ad basin rufescentibus, tibiis anticis et intermediis pro parte nigris, antennis, his apice brunnescentibus, pedibusque pro parte testaceis; capite robusto, antice punctato-ruguloso, postice læve; thorace sulcato, ad basin bigibboso; elytris latis, brevibus, antice argenteo fasciatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *centurio* Laf., très distinct par son prothorax sillonné et sa fascie blanche élytrale.

Leptaleus luteofasciatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, articulo 1° antennarum, femoribus ad basin aliquot, tibiis pro parte tarsisque testaceis, elytris antice et breve luteo fasciatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *unifasciatus* Desbr., coloration plus foncée, antennes noires avec le premier article seul testacé, etc.

L. testaceonotatus n. sp. Elongatus, nitidus, breve pubescens, rufus, elytris apice nigris et luteo maculatis, his fortiter punctatis; membris testaceis, antennis apice piceis. Long. 3 mill. Tonkin. — Très voisin de *delicatulus* Laf., distinct, à première vue, par les élytres foncés au sommet, la coloration noire entamant une macule antéapicale testacée.

Anthicus ivoirensis n. sp. Oblongus, parum nitidus, piceus, thorace rufo, antennis testaceis, apice piceis, pedibus pro parte piceis, pro parte testaceis; capite lato, fortiter sat dense punctato; thorace breve, antice valde dilatato, postice tuberculato; elytris latis et brevibus, ad basin depressis. — A placer près de *elisicollis* Pic, plus trapu, tête plus fortement ponctuée antérieurement, etc.

A. sinuatolineatus n. sp. Oblongus, nitidus, breve pubescens, testaceus, elytris ad suturam lateraliter et apice piceo signatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Forme de *floralis* L., mais élytres ornés de dessins foncés, à contours sinués, un peu variables et joints transversalement vers l'extrémité.

A. longehirsutus n. sp. Oblongus, nitidus, longe hirsutus, rufus, capite antice membrisque testaceis, elytris piceis, antice et postice late testaceo maculatis, thorace elytrisque fortiter punctatis; capite lato, parum punctato. Long. 3,5 mill. Tonkin. — Voisin de *subrubrocinctus* Mars.

A. binhensis n. sp. Oblongus, nitidus, sparse hirsutus, niger, membris testaceis, elytris antice et pos-

tice late testaceo maculatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin du précédent.

Eudomia tonkinea n. sp. Oblongus, subopacus, dense punctatus, rufus, elytris ad basin, ad medium et apice piceo notatis, capite antennisque apice nigris, his validis. Long. 2,5 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa coloration élytrale, jointe à ses antennes très epaissies à l'extrémité.

Micropelecotoides celebensis n. sp. Elongatus, rufus, sericeo pubescens, capite pro parte pectoreque piceis, elytris lineatis. Long. 7 mill. Célèbes. — Voisin de *sumatrensis* Pic, prothorax plus rétréci en avant, élytres plus longs.

M. atriceps n. sp. Elongatus, luteo pubescens, rufus, capite pectoreque nigris; elytris pro parte denudatis. Long. 3 mill. Madura. — Plus étroit que *sumatrensis* Pic et autrement coloré.

M. madurensis n. sp. Oblongo-elongatus, subopacus, dense punctatus, niger, antennis ad basin, pedibus, abdomine apice elytrisque ad basin rufis. Long. 3,8 mill. Indes. — Plus foncé et plus robuste que le précédent. — Le **minutus** mihi, de Tarvena (ex Doherty), est plus petit, moins allongé, et n'a pas les élytres marqués de roux à la base.

M. bruneiensis n. sp. Oblongus, fere opacus, luteo pubescens, rufus, antennis apice, pedibus pro parte et infra corpore nigris. Long. 7 mill. Bornéo. — Voisin de *japonicus* Pic, moins allongé avec le dessous du corps plus foncé. — Le **M. irregularis** mihi, de Java, très voisin du précédent, a le dessous du corps roux, comme le dessus, et les élytres mouchetés de taches plus claires et pubescentes.

M. major n. sp. Oblongo-elongatus, griseo aut luteo pubescens, niger, antennis ad basin thoraceque rufis; elytris ad suturam albo lineatis. Long. 7 mill. Tonkin. — Voisin de *Rouyeri* Pic et distinct, à première vue,

par son prothorax roux. — Le **M. lineatus** mihi, de Java, offre une coloration analogue au précédent, mais le prothorax est nettement déprimé au milieu, maculé de brun sur le disque et les élytres offrent plusieurs lignes blanches.

Leptura bilineatithorax n. sp. Angustatus, postice attenuatus, rufo-testaceus, infra nigro notatus, thorace pro parte atro marginato, in disco nigro bilineato, elytris antice pro parte nigro marginatis et in disco nigro maculatis, macula secunda externa. Long. 28 mill. Tonkin. — Grande et belle espèce, voisine par sa forme de *Aurivillei* Pic, mais autrement colorée.

Toxotus superbus n. sp. Robustus, parum nitidus, pro parte argenteo pubescens, testaceus, nigro notatus, antennis nigris, ad basin rufis et apice albis; thorace breve et robusto, testaceo, nigro marginato et in disco nigro maculato; elytris brevibus, postice attenuatis, testaceis, pro majore parte piceo marginatis; pedibus nigris, femoribus testaceis, nigro notatis. Long. 15 mill. Tonkin. — Voisin de *aureopubens* Pic, plus robuste et à revêtement différent.

Thranius multinotatus n. sp. Elongatus, subparallelus, piceus, capite, thorace et antennis ad basin tibiisque pro parte rufis, elytris piceis, multi luteo notatis, strangulatis, antice dilatatis. Long. 15 mill. Tonkin. — Les élytres offrent une lunule (ouverte en arrière) humérale, plusieurs petites taches antérieures externes, une discale avant le milieu et une plus longue apicale, celles-ci jaunes. — A placer près de *triplagiatus* Gah., très distinct par sa coloration.

Epania ruficollis n. sp. Robustus, hirsutus, niger, capite, thorace, antennisque ad basin rufis, elytris pedibusque posticis cyaneis, femoribus ad basin testaceis; thorace granulato; elytris latis et brevibus, ad suturam impressis et dense punctatis marginatis; pedibus robustis, femoribus arcuatis plus minusve claviformibus, tibiis posticis sinuatis et pro parte dense ci-

liatis. Long. 8 mill. Laos. — Peut se placer près de *singaporensis* Ths., distinct, à première vue, par son avant-corps roux.

Holangus ruficornis n. sp. Elongatus, fere opacus, niger, elytris rufis, pro parte nigro marginatis, membris rufis, tarsis pro parte, femoribus et tibiis posticis apice nigris. Long. 15 mill. Tonkin. — Distinct, à première vue, de *flavonotatus* Pic, par la coloration plus claire des membres et les élytres autrement colorés.

Falsodebilia curtelineata n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris in disco luteo vittatis, antennis pro majore parte tarsisque rufis. Long. 10 mill. Tonkin. — Très distinct de *metallica* Pic par les élytres ornés d'une bande discale jaune éloignée de la base et de l'extrémité.

Callimus testaceus n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis pro parte, tarsis pedibusque posticis (femoribus ad basin late testaceis) piceis, elytris antice testaceis, postice late piceis. Long. 8 mill. Indes: Kulu. — Très distinct de nos *Callimus* Muls. paléarctiques par la coloration.

Merionœda inapicalis n. sp. Testaceus, capite et femoribus posticis apice nigris, antennis apice brunnescentibus. Long. 7 mill. Indes. — Voisin de *nigriceps* Whit. et distinct, à première vue, par les élytres non foncés à l'extrémité.

M. distinctipes n. sp. Rufus, elytris apice brunnescentibus, capite antennisque nigris, pedibus testaceis, femoribus intermediis et posticis tibiisque postice apice nigris. Long. 10 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par la structure de ses pattes, les tibias intermédiaires sinués et dilaté-aplatis au sommet avec les tarses fortement élargis. — A placer près de *Andewsi* Gah.

Hypomares ater n. sp. Parum elongatus, opacus, dense griseo pubescens, niger, antennis pedibusque rufis, femoribus late nigris; thorace breve, lateraliter

fortiter tuberculato; elytris subcostulatis, ad basin in disco impressis. Long. 17 mill. Tonkin. — Ressemble à *brunneus* Ths., mais prothorax plus robuste et coloration plus foncée.

Falsoibidion n. gen. Corpus angustatus; capite breve, oculis intus attenuatis; antennis filiformibus, ciliatis; thorace cylindrico, longissimo; femoribus clavatis. — Peut se placer près du genre *Leptoxenus* Bates, mais le prothorax est tout autre, plus long et non tuberculé.

Falsoibidion fasciatum n. sp. Angustatus, fere opacus, sparse hirsutus, rufo-testaceus, thorace elytrisque nigro fasciatis, pectore femoribusque brunneo notatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Le prothorax a le bord postérieur et une fascie antémédiane noires et les élytres ont trois fascies noires étroites raccourcies, première avant et deuxième (un peu oblique) après le milieu, troisième avant le sommet.

Chapaon n. gen. Oculis minutis, reniformibus; antennis elongatis; thorace elongato, lateraliter sinuato et gibboso, antice transverse sulcato, in disco inæquale, postice lateraliter inciso et ciliato; femoribus claviformibus; coxis anticis globulosis, approximatis; abdomine lateraliter impresso, apice inciso et lobato, pygidio prominulo. — Peut se placer près de *Digonium* Pic, prothorax différent, antennes plus robustes, etc.

Chapaon rufum n. sp. Elongatus, fere opacus, luteo pubescens, rufus, articulis 2 et sequentibus antennarum nigris; elytris thorace latioribus, costatis, fortiter punctatis, apice subrotundatis. Long. 15 mill. Tonkin : Chapa.

Tetraommatus spinicollis n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, thorace piceo, in disco late et lateraliter breve luteo notato, postice testaceo marginato, elytris testaceis, post scutellum piceo cinctis et infra humeros piceo maculatis, ad et post medium oblique piceo fasciatis. Long. 10 mill. Tonkin. — A placer près de *insignis* Gah.

Purpuricenus diversithorax n. sp. Parum elongatus, subopacus, niger, elytris ad basin et post medium testaceo bimaculatis. Long. 17-20 mill. Tonkin. — Espèce très distincte, en plus des élytres quadrimaculés, par la ponctuation du prothorax en partie fine sur les côtés et en avant, en partie forte et nettement granuleuse sur le milieu et postérieurement.

P. atromaculatus n. sp. Latus, opacus, niger, elytris luteis, maculis rotundatis tribus (2, 1) nigris ornatis; thorace intuberculato. Lnog. 15 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par son prothorax n'ayant pas de tubercule apparent, pouvant rentrer ainsi dans un nouveau sous-genre que je nomme **Luteicenus.**

Erythrus apicalis n. sp. Elongatus, niger, capite postice, thorace, illo in disco nigro bimaculato, elytrisque rubris, his apice nigro notatis. Long. 16 mill. Annam. — Voisin de *laticornis* Frm. et distinct, à première vue, par les élytres marqués de foncé au sommet.

Epipedocera atritarsis n. sp. Opacus, niger, abdomine elytrisque apice rufis, his eburneo fasciatis et apice bidentatis, scutello, thorace postice et infra corpore pro parte albido pubescentibus. Long. 8 mill. Tonkin. — Très voisin de *Guerryi* Pic, mais tarses foncés, élytres plus largement roux au sommet, abdomen roux.

Halme rufofemorata n. sp. Satis robustus, niger, supra viridescens, femoribus rufis, elytris ad medium albido fasciatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce voisine de *Saccomanti* Pic et distincte, à première vue, par la massue des fémurs rousse.

Demonax maximus n. sp. Elongatus, opacus, niger, pro parte albo notatus; thorace elongato, subsinuato, in disco nigro binotato, postice albo notato, elytris nigris, ad basin et apice griseo pubescentibus, ad et post medium griseo fasciatis, fascia prima ad scutellum remota. Long. 20 mill. Tonkin. — Belle et grande espèce, pouvant prendre place près de *langsonius* Frm.

Perissus globithorax n. sp. Oblongus, niger, griseo pubescens; thorace globuloso, in disco nigro notato; elytris nigris, griseo trifasciatis, fasciis ad suturam junctis et apice late griseo notatis, infra corpore pro parte albido. Long. 11 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *lætus* Lam.

Coptops subfasciatus n. sp. Robustus, niger, dense griseo pubescens, pro parte piceo maculatus, supra longitudinaliter sublineatus, elytris postice transverse albo fasciatis, articulis ultimis antennarum nigris aut apice nigro annulatis. Long. 15 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par son revêtement particulier.

Mesosa unifasciata n. sp. Oblongo-elongatus, luteo, fulvo et griseo parum dense pubescens, pro parte et diverse nigro notatus, elytris ante medium nigro-undulato fasciatis, antennis nigris, articulis pro parte ad basin griseis. Long. 9-12 mill. Tonkin. — Voisin de *taliana* Pic, moins robuste, antennes moins annelées avec plusieurs articles foncés, élytres à fascie noire bien distincte.

Erysamena albonotata n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, antennis pro parte elytrisque rufescentibus, his regulariter et lineato albo maculatis. Long. 9 mill. Tonkin. — Les rangées de mouchetures blanches semblent caractériser cette espèce.

E. lineaticallis n. sp. Angustatus, niger, supra pro parte rufescens et signaturis nigris notatus. Long. 7 mill. Tonkin. Plus allongé que le précédent avec le prothorax orné de 2 bandes discales noires et les élytres avec une macule prescutellaire et 3 macules postérieures discales et une ponctuation noire dispersée. — Le **E. indentata** mihi, du Tonkin, est très voisin du précédent, avec le prothorax plus robuste sans lignes noires, les élytres, à dessins analogues, sont dépourvus de dent pileuse antérieure discale.

Menesia testaceipennis n. sp. Niger, supra testa-

ceus, pro parte luteo pubescens, membris testaceis, antennis ad basin et apice nigris. Long. 6 mill. Tonkin. — Espèce très facile à distinguer par sa coloration.

Phytoecia obscurithorax n. sp. Elongatus, dense griseo pubescens, niger, femoribus plus minusve rufis, thorace nigro trimaculato. Long. 12 mill. Chine. — Très voisin de *Guilleti* Pic dont il diffère, à première vue, par le prothorax foncé.

Alurnus divisus n. sp. Oblongus, fere opacus, niger, supra vage cærulescens, elytris luteis, antice macula bilobata nigra munitis, postice transversale nigro fasciatis et nigro marginatis. Long. 23 mill. Amazones. — Voisin de *cassideus* W., mais prothorax à peine pubescent et moins tranversal, élytres moins élargis, peu explanés et à dessins interrompus.

A. Salvini v. nov. panamensis. Elytris luteis, reducte et oblique bifasciatis, apice nigris. Panama. — Par ses dessins élytraux intermédiaire entre *Salvini* Baly et *undatus* Brême.

Mecistomela marginata v. nov. reducta. Elytris rufo-marginatis, ad medium et in disco breve rufo fasciatis. Brésil.

M. marginata v. nov. brevenotata. Elytris testaceo marginatis, ad medium et lateraliter breve testaceo notatis. Brésil.

M. corallina v. nov. bijuncta. Maculis nigris anticis et posticis elytrorum in singulo junctis. Brésil.

Psilurnus bicoloripes n. sp. Niger, macula frontalis prothorace, illo nigro marginato, femoribusque pro parte rufis; elytris nigro-subcæruleis, sat fortiter et late punctatis. Long. 25-27 mill. Brésil. — Voisin de *Donckieri* W., distinct, à première vue, par les élytres moins fortement ponctués et presque mats.

Temnaspis bidentatus n. sp. Robustus, testaceus tibiis, tarsis elytrisque nigris; thorace subquadrato; hu-

meris prominulis; femoribus posticis bidentatis. Long. 13 mill. Assam. — Voisin de *nigripennis* Jac., distinct, à première vue, par les cuisses bidentées.

Cryptocephalus brevebilineatus n. sp. Subovatus, nitidus, rufus, antennis apice, pectore pro parte, tibiis tarsisque plus minusve piceis, scutello testaceo, elytris nigris, ad basin testaceo breve bilineatis et apice late testaceo notatis; thorace satis breve, transverso, minute punctato; elytris brevibus, lineato-punctatis et parum distincte striatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *Moutoni* Pic, plus robuste et élytres autrement maculés.

C. yunnanus v. nov. semicærulescens. Thorace nigro-piceo, lateraliter minute et diverse rufo-marginato, capite late obscuro, elytris nigro-cæruleis. Chine. — Distinct, à première vue, de la forme type par le prothorax presque entièrement foncé.

C. suboblongus n. sp. Suboblongus, nitidus, nigro-piceus, capite, antennis ad basin, thorace, illo in disco nigro notato, tibiisque pro parte rufis; thorace satis breve, transverso, minute punctato; elytris satis brevibus, lineato-punctatis, fere instriatis. Long. 3 mill. Yunnan. — A placer près de *curtipennis* Pic.

C. Guernei n. sp. Oblongus, postice attenuatus, rufus, infra corpore pro majore parte nigro, elytris testaceis, ad humeros nigro maculatis, scutello rufo, nigro cincto; thorace breve, sat fortiter punctato, postice nigro marginato; elytris satis brevibus, postice attenuatis, lineato-punctatis, ad basin nigro marginatis. Long. 3 mill. Colombo. — A placer près de *Sehestedti* F.

C. cinctovittatus n. sp. Oblongus, postice parum attenuatus, rufus, pro parte testaceus, antennis apice scutelloque nigris, thorace elytrisque pro parte nigro cinctis, illo in disco vage brunneo bimaculato, his in disco et ad suturam nigro vittatis, vitta discoidalis in

medio luteo signata. Long. 3 mill. Indes. — Voisin du précédent, prothorax moins ponctué, dessins noirs des élytres différents, ceux-ci ayant entre autres une bande discale noire variable entourant (au moins en partie) une étroite bande testacée.

C. subsemicinctus n. sp. Oblongo-ovatus, rufus, pectore, scutello elytrisque nigris, his apice rufo notatis. Long. 3,5 mill. Indo-Chine. — En outre de la coloration, diffère du précédent par la ponctuation élytrale plus forte.

Je considère, provisoirement, comme variété de ce dernier, sous le nom de **hanoiensis,** un exemplaire, de Hanoï, roux sur le dessus du corps, avec les élytres bordés en partie de noir, ayant une courte fascie noire remontant sur les côtés et jointe à une macule humérale également noire, tandis que la suture est largement marquée de noir.

Binhon n. gen. Mandibulis validis; antennis brevibus, pectinatis; thorace lateraliter sinuato et marginato, ad medium subangulato; elytris longissimis; pedibus gracilibus, tarsis 5 articulatis; coxis posticis excavatis; coxis anticis parum approximatis, satis brevibus; prosterno carinato.

Je classe provisoirement ce genre curieux dans les Dascillides, près de *Aploglossa* Guer.; il est très distinct de ce dernier par la forme du prothorax, la structure des antennes, les tarses de 5 articles minces et longs.

Binhon atrum n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, sparse griseo pubescens, ater; capite breve, antice dense, in vertice sparse, punctato; thorace fortiter pro parte sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, irregulariter punctatis et plicatis. Long. 12 mill.

Ototreta robusta n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis pro majore parte, tibiis tarsisque piceis, elytris nigris, epipleuris et sutura rufis. Chine. Long.

7 mill. — Ressemble à *fornicata* E. Ol., plus robuste, élytres avec la suture rousse, antennes plus grosses, etc.

Malthinus reductelineatus n. sp. Elongatus, subopacus, testaceus, antennis apice nigris, capite postice et thorace in disco nigro lineatis. Long. 5 mill. Formose. — Voisin de *sinensis* Pic, tête plus rétrécie derrière les yeux et seulement maculée de noir sur le milieu du vertex, prothorax moins large, etc.

M. atripennis n. sp. Elongatus, subopacus, griseo pubescens, niger, antennis ad basin thoraceque lateraliter testaceis, illo plus ♂, minusve ♀, elongato; elytris sparse granulatis. Long. 5 mill. Formose. — Espèce facile à reconnaître par ses élytres éparsément granuleux et noirs.

Silis nitidissima n. sp. Elongatus, nitidissimus, niger, thorace rufo, illo breve, antice lateraliter dilatato, postice fere recte ♀, aut breve sat late dentato ♂. Long. 4 mill. Yunnan. — A placer près de *carinaticeps* Pic, très distinct par l'aspect plus brillant, la tête foncée, etc.

S. falsa n. sp. Robustus, nitidus, niger, thorace geniculisque rufis; capite breve; antennis satis brevibus; thorace breve, lateraliter ad medium dilatato, postice paulo inciso, angulis posticis dentatis; elytris thorace non latioribus, ruguloso-punctatis, in disco bicostulatis. Long. 6 mill. — Reçu avec l'étiquette « Asie Mineure », mais fausse provenance selon moi; est peut-être originaire des Indes. Peut se placer près de *langana* Pic.

Cantharis nigroannulata n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris nigris, pectore late piceo, femoribus apice nigro annulatis, tarsis pro parte piceis; thorace elongato; elytris satis brevibus, rugulosis. Long. 10 mill. Chine. — A placer près de *limbobaria* Frm., en diffère par les élytres concolores, les cuisses annelées de noir, etc.

C. nigroimpressa n. sp. Parum elongatus, niger, capite antice, thorace lateraliter late, antennarum ad basin pedibusque testaceis, elytris nigris, lateraliter testaceo marginatis; capite robusto; thorace breve et lato, in disco impresso; elytris thorace fere æqualibus. Long. 7-8 mill. Chine. A placer près de *disconiger* Pic.

C. similithorax n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, elytris apice brunnescentibus; thorace satis elongato, antice valde arcuato. Long. 13 mill. Chine. — Voisin de *thibetana* Pic par la forme de son prothorax et distinct, à première vue, par la coloration des élytres.

C. tcheonana n. sp. Elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin, thorace, illo in disco nigro maculato, femoribus et infra corpore pro parte testaceis, elytris viridi-metallicis. Long. 12 mill. Chine. — Voisin de *basicornis* Frm., macule prothoracique plus petite et cuisses entièrement testacées.

C. rufoscuta n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite, antennis elytrisque viridi-metallicis; thorace rufo-testaceo, postice viridi bimaculato, pedibus nigris, femoribus ad basin late rufo-testaceis. Long. 14-15 mill. Yunnan-Fou. — A placer près de *viridissima* Pic et distinct, à première vue, par son écusson roux.

C. atricolor n. sp. Minutus, subparallelus, fere opacus, niger, griseo pubescens, capite antice et antennis ad basin rufo-notatis; thorace subquadrato, late multiimpresso. Long. 6 mill. Chine. — Voisin de *seximpressa* Pic par sa structure prothoracique, mais tout autre par sa coloration.

C. reductenotata n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, parum nitidus, niger, abdomine pro parte testaceo, thorace rufo, in disco minute nigro bimaculato, elytris viridescentibus, ad basin nitidis. Long. 18 mill. Chine. — A placer près de *imperialis* Gorh., plus trapu avec le prothorax à peine maculé.

C. senensis n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, nitidus, elytris subopacis, nigro-cyaneus, antennis, articulis primis nigris exceptis, abdomine, illo nigro maculato, thoraceque pro majore parte testaceis; thorace transverso, in disco late nigro-violaceo maculato; elytris viridi-olivaceis, rugulosis. Long. 20-22 mill. Yunnan-Sen. — Voisin de *imperialis* Gorh. et distinct, à première vue, par les élytres verts.

C. brunneonotaticeps n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite postice, thorace in medio membrisque pro parte brunnescentibus; thorace subquadrato; elytris subparallelis, rugulosis. Long. 11 mill. Chine. — A placer près de *lineolata* Pic, distinct par le prothorax maculé de brun, les pattes non entièrement foncées, etc.

Cavoplateros dentatus n. sp. Antennis apice non dilatatis (s.-g. nov. **Pseudeuplectus**). Elongatus, niger, femoribus ad basin, thorace lateraliter et humeros breve testaceis; thorace elongato, antice arcuato; spina femorum longissima, fere recta. Long. 7 mill. Panama.

C. ater n. sp. Elongatus, niger, spina femorum longissima, sinuata. Long. 7 mill. Pérou. — Très distinct de *spinipes* Pic par la forme plus parallèle et le prothorax non échancré sur les côtés.

C. singularipes n. sp. Nigro-piceus, femoribus ad basin thoraceque lateraliter testaceis ; thorace satis elongato; spina femorum apice dilatata et truncata. Long. 7 mill. Equateur. — Très distinct par sa coloration.

Le **C. vicinus** mihi, du Pérou, de coloration semblable au précédent, en diffère par le prothorax plus large et le premier article des antennes plus grand.

TABLE

POUR LE TRENTE-SIXIÈME FASCICULE

Page

Nouveautés diverses 1